

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

1. Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto

Mercado	Nome comercial do produto
Portugal	Ratkill
Portugal	Vertox Forte Pellet
Portugal	Ratatox Ultra Pellets

1.2. Titular da Autorização

Número da autorização	PT-0024767-0000					
Data da autorização	2020-09-17					
Data de caducidade da autorização	2023-03-14					
Nome e endereço do titular da autorização	Nome	PelGar International Limited				
	Endereço	Unit 13 Newman Lane	GU34 2QR	Alton	United Kingdom	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	PelGar International Limited						
Endereço do fabricante	Unit 13, Newman Lane	GU34 2QR	Alton, Hants	Reino Unido			
Localização das instalações de fabrico	Unit 13, Newman Lane	GU34 2QR	Alton, Hants	Reino Unido			
	Promedivet SRL	545500 SOVATA	, str. Lunga nr. 46/G	jud. Mures,	Roménia		
	Agrochema	675 02	Konesin	República Checa			
	VET PERMUTADORA, S.A.	Rua dos Navegantes, 48 r/c Esq.	1200-732	Lisboa	Portugal		

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Número BAS: 11						
Nome do fabricante	PelGar International Limited					
Endereço do fabricante	Unit 13, Newman Lane	GU34 2QR	Alton, Hants	Reino Unido		
Localização das instalações de fabrico	Prazska 54	280 02	Kolin	República Checa		

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Número BAS	Número CE	Número CAS	Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Teor (%)
11	259-980-5	56073-10-0	Brodifacume	3-[3-(4'-bromobiphenyl- 4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Substância ativa	0.0025

2.2. Tipo de formulação

RB - Isco (pronto a usar)

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo

"Pode afectar os órgãos

(sangue)

após exposição prolongada ou repetida

.

Recomendações de prudência

Não respirar

poeiras

.

Em caso de indisposição, consulte um médico.

Eliminar o conteúdo em

acordo com a legislação nacional em vigor

.

4. Utilização(ões) autorizada(s)

4.1. Rato-doméstico – Público em geral – Interior

Tipo(s) do produto	TP 14 - Rodenticidas		
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas.		
Campos de utilização	Interior Interior		
Categoria(s) de utilizadores	Público em geral (não profissional)		
Organismos alvo	Nome científico Mus musculus	Nome comum Rato-doméstico	Estadio de desenvolvimento Adultos e Juvenis

Método(s) de aplicação

Método	Aplicação de isco
Descrição	Isco pronto a usar em estações de isco invioláveis
Taxa: isco.	Para rato-doméstico, até 20g de isco por estação de isco.
Diluição:	0%
Duração:	Rato-doméstico: 5 a 20g de isco por estação de isco. Infestação elevada – 1 saqueta de isco por estação, a cada 2 metros. Infestação baixa – 1 saqueta de isco por estação, a cada 5 metros.

Capacidade e material da embalagem

Quantidade máxima por embalagem
50g.

15, 20, 25, 30 ou 50g saquetas papel/PE ou Al/PE ou papel/Al/PE saquetas, ambas em caixa de cartolina/cartão micro-canelado.
Embalagem primária: saquetas papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: cartolina/cartão canelado 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g

Isco a granel até 20 g, embalado em tabuleiros de iscos envoltos em película selada a quente, dentro de caixas exteriores. Embalagem primária: tabuleiros de iscos com película selada a quente. Embalagem secundária: cartão canelado 10g, 15g, 20g (embalado em múltiplos de 1/2/4). Máximo permitido 50g.

Isco a granel até 20g, embalado em tabuleiros de isco com uma tampa selada a quente, envolvida em filme inviolável de uso único ou múltiplo HDPE ou estação de isco PP, tudo embalado em múltiplos de 1, 2 ou 4 numa caixa exterior de cartão ou blister ou manga de cartão canelado ou saco selado a quente a quente com um topper de cartão micro-canelado. Embalagem primária: bandejas de isco com tampa selada a quente. Embalagem secundária: HDPE ou PP estação de isco, embalado em cartão canelado exterior ou embalagem blister ou saco selado a quente ou PE exterior selado a quente com um topper de cartão 10g, 15g, 20g (embalado em múltiplos de 1/2/4). Máximo permitido 50g.

4.1.1. Instruções específicas de utilização

Para rato doméstico, usar 5-20g de isco em estações de isco invioláveis.

Aplicar 5-20g de isco em estações de isco invioláveis, espaçadas a cada 5m (para infestações severas separadas cada 2m), em áreas de actividade dos roedores. O rato-doméstico é muito curioso e pode ajudar o programa de

controlo, mover os iscos a cada 2-3 dias no momento em que os pontos de isco são inspeccionados ou reabastecidos. Fazer inspecções frequentes às estações de isco durante os primeiros 10-14 dias e substituir o isco comido pelos roedores, danificados por água ou contaminados por sujidade. Se em algumas zonas o isco foi comido, aumentar a quantidade de isco, colocando mais estações de isco. Não aumentar o tamanho do ponto de isco. Substituir o isco comido pelos roedores, danificados por água ou contaminados por sujidade.

As estações de isco devem ser visitadas a cada 2 a 3 dias após o início do tratamento e posteriormente pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactos e para remover os corpos de roedores. Reabastecer as estações de isco se necessário.

A utilização deste produto deve eliminar roedores no prazo de 35 dias. A informação do produto (i.e. rótulo e/ou folheto) deve claramente recomendar que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (i.e. a actividade dos roedores ainda é observada), o usuário deve procurar aconselhamento do fornecedor do produto ou chamar um serviço profissional de controlo de pragas.

Não usar este produto como isco permanente ou faseado.

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Nenhuma

4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o

Nenhuma

4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuma

4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuma

4.2. Ratazanas - Público em geral - Interior

Tipo(s) do produto	TP 14 - Rodenticidas		
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas.		
Campos de utilização	Interior		
	Interior		
Categoria(s) de utilizadores	Público em geral (não profissional)		
Organismos alvo	Nome científico	Nome comum	Estadio de desenvolvimento
	Rattus norvegicus	Ratazana Cinzenta	Adultos e Juvenis
Método(s) de aplicação			
Método	Aplicação de isco		
Descrição	Isco pronto a usar em estações de isco invioláveis.		

Taxa:	Para ratazanas, até 60g de isco por estação de isco.
Diluição:	0%
Duração:	
	Ratazanas – 10 a 60g de isco por estação de isco.
	Infestação elevada – 1 saqueta de isco (50g) ou 1 a 2 saquetas (25g ou 30g) ou 1 a 3 saquetas (15g ou 20g) em estações de isco, a cada 5 metros.
	Infestação baixa – 1 saqueta de isco (50g) ou 1 a 2 saquetas (25g ou 30g) ou 1 a 3 saquetas (15g ou 20g) em estações de isco, a cada 10 metros.

Capacidade e material da embalagem

Quantidade máxima de isco por embalagem 150g.

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas papel/PE ou Al/PE ou papel/Al/PE em embalagens de PE/PP. Embalagem primária: saquetas papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: embalagens PE/PP embalagens (saquetas, bolsas) 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g.

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas papel/PE ou Al/PE ou papel/Al/PE ambas em cartolina/PE. Embalagem primária: saquetas papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: embalagens cartolina/PE (saquetas, bolsas) 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g.

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas papel/PE ou Al/PE ou papel/Al/PE, ambas em cartolina/cartão micro-canelado. E mbalagem primária: saquetas papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: cartolina/cartão canelado 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g.

Isco a granel até 60g embalados em tabuleiros de isco envolto em película selada a quente, em múltiplas embalagens e caixas de cartão exteriores. Embalagem primária: Tabuleiros de isco com película selada a quente. Embalagem secundária: cartão exterior 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (embalados em múltiplos de 2/4/8/12/15). Máximo permitido 150g

Isco a granel até 60g embalados em tabuleiros de isco envolto em película selada a quente, individual ou estação de isco multiusos inviolável HDPE ou PP, embaladas em múltiplos de 1, 2 ou 4 em embalagem de cartão canelado externa ou blister ou embalagem de cartão canelado ou saco PE selado a quente com cartão canelado. Embalagem primária: tabuleiros de isco com tampa selada a quente. Embalagem secundária: HDPE ou PP estação de isco embalado em caixa de cartão exterior ou blister ou manga de cartão canelado ou saco selado a quente ou PE selado a quente com tampa de 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (embalado em múltiplos de 1, 2 ou 4). Máximo permitido 150g

4.2.1. Instruções específicas de utilização

Para ratazanas, usar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas de 10m.

Aplicar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas de 10m (separadas por 5m em áreas de elevada infestação) em áreas de actividade dos roedores.

Verificar regularmente o consumo do isco e substituir o isco consumido ou estragado até que o consumo tenha parado. Repetir o tratamento em situações em que haja evidência de nova infestação (por exemplo, novas trilhos ou excrementos). Não mova ou perturbe os pontos de isco por vários dias após a colocação do isco.

Caso não haja nenhum sinal de actividade das ratazanas próximo do isco após 7-10 dias, mover o isco para uma área de maior actividade das ratazanas. Se todo o isco foi comido em certas áreas, aumente a quantidade de isco colocando mais pontos de isco. Não aumente o tamanho do ponto de isco. Substitua o isco comido por roedores, danificado por água ou contaminado por sujidade.

As estações de isco devem ser verificadas apenas 5 a 7 dias após o início do tratamento e posteriormente pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e remover os corpos de roedores. Reabastecer o isco quando necessário.

A utilização deste produto deve eliminar roedores no prazo de 35 dias.
A informação do produto (i.e. rótulo e/ou folheto) deve claramente recomendar que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (i.e. a actividade dos roedores ainda é observada), o usuário deve procurar aconselhamento do fornecedor do produto ou chamar um serviço profissional de controlo de pragas. Não usar este produto como isco permanente ou faseado.

4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Nenhuma

4.2.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o

Nenhuma

4.2.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuma

4.2.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuma

4.3. Ratazanas – Público em geral – Exterior, ao redor de edifícios

Tipo(s) do produto	TP 14 - Rodenticidas		
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas.		
Campos de utilização	Exterior		
de edifícios	Exterior, ao redor		
Categoria(s) de utilizadores	Público em geral (não profissional)		
Organismos alvo	Nome científico Rattus norvegicus	Nome comum Ratazana Cinzenta	Estadio de desenvolvimento Adultos e Juvenis
Método(s) de aplicação			
Método	Aplicação de isco		
Descrição	Isco pronto a usar em estações de isco invioláveis.		
Taxa: espaçadas em 10m.	Para ratazanas, usar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis		
Diluição:	0%		
Duração:	Ratazanas: 10 a 60g de isco por estação de isco.		
	Infestação elevada – 1 saqueta de isco (50g) ou 1 a 2 saquetas (25g ou 30g) ou 1 a 3 saquetas (15g ou 20g) em estações de isco, a cada 5 metros.		
	Infestação baixa – 1 saqueta de isco (50g) ou 1 a 2 saquetas (25g ou 30g) ou 1 a 3 saquetas (15g ou 20g) em estações de isco, a cada 10 metros.		
Capacidade e material da embalagem			

Quantidade máxima de isco por embalagem: 150g

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas papel/PE ou Al/PE ou papel/Al/PE em embalagens de PE/PP. Embalagem primária: saquetas papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: embalagens PE/PP embalagens (saquetas, bolsas) 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas papel/PE ou Al/PE ou papel/Al/PE ambas em cartolina/PE. Embalagem primária: saquetas papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: embalagens cartolina/PE (saquetas, bolsas) 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g.

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas papel/PE ou Al/PE ou papel/Al/PE, ambas em cartolina/cartão micro-canelado. Embalagem primária: saquetas papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: cartolina/cartão canelado 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g.

Isco a granel até 60g embalados em tabuleiros de isco envolto em película selada a quente, em múltiplas embalagens e caixas de cartão exteriores. Embalagem primária: Tabuleiros de isco com película selada a quente. Embalagem secundária: cartão exterior 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (embalados em múltiplos de 2/4/8/12/15). Máximo permitido 150g.

Isco a granel até 60g embalados em tabuleiros de isco envolto em película selada a quente, individual ou estação de isco multiusos inviolável HDPE ou PP, embaladas em múltiplos de 1, 2 ou 4 em embalagem de cartão canelado externa ou blister ou embalagem de cartão canelado ou saco selado a quente ou PE selado a quente com cartão canelado. Embalagem primária: tabuleiros de isco com tampa selada a quente. Embalagem secundária: HDPE ou PP estação de isco embalado em caixa de cartão exterior ou blister ou manga de cartão canelado ou saco selado a quente ou PE selado a quente com tampa de 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (embalado em múltiplos de 1, 2 ou 4). Máximo permitido 150g.

4.3.1. Instruções específicas de utilização

Aplicar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas de 10m (separadas por 5m em áreas de elevada infestação) em áreas de actividade dos roedores.

Verificar regularmente o consumo do isco e substituir o isco consumido ou estragado até que o consumo tenha parado. Repetir o tratamento em situações em que haja evidência de nova infestação (por exemplo, novos trilhos ou excrementos). Não mova ou perturbe os pontos de isco por vários dias após a colocação do isco.

Caso não haja nenhum sinal de actividade das ratazanas próximo do isco após 7-10 dias, mover o isco para uma área de maior actividade das ratazanas. Se todo o isco foi comido em certas áreas, aumente a quantidade de isco colocando mais pontos de isco. Não aumente o tamanho do ponto de isco. Substitua o isco comido por roedores, danificado por água ou contaminado por sujidade.

As estações de isco devem ser verificadas apenas 5 a 7 dias após o início do tratamento e posteriormente pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e remover os corpos de roedores. Reabastecer o isco quando necessário.

A utilização deste produto deve eliminar roedores no prazo de 35 dias. A informação do produto (i.e. rótulo e/ou folheto) deve claramente recomendar que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (i.e. a actividade dos roedores ainda é observada), o usuário deve procurar aconselhamento do fornecedor do produto ou chamar um serviço profissional de controlo de pragas.

4.3.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Nenhuma

4.3.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o

Nenhuma

4.3.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuma

4.3.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuma

4.4. Rato-doméstico - Profissionais - Interior

Tipo(s) do produto		TP 14 - Rodenticidas		
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada		Não relevante para rodenticidas.		
Campos de utilização		Interior		
		Interior		
Categoria(s) de utilizadores		Profissional		
Organismos alvo		Nome científico	Nome comum	Estádio de desenvolvimento
		Mus musculus	Rato-doméstico	Adultos e Juvenis
Método(s) de aplicação				
Método		Aplicação de isco		
Descrição		Isco pronto a usar em estações de isco invioláveis.		
Taxa:		Para rato-doméstico, usar até		
20g de isco por estação de isco				
Diluição:		0%		
Duração:		Rato-doméstico: 5 a 20g de isco por estação de isco		
		Infestação elevada – 5 a 20g isco em estações de isco, a cada 2 metros.		
		Infestação baixa – 5 a 20g isco em estações de isco, a cada 5 metros.		
Capacidade e material da embalagem				
Tamanho mínimo de embalagem de 2,5 Kg.				
25Kg em papel multi-folhas laminando com PE (barreira de humidade) ou papel multi-folhas com saco PE interno ou PP tecido com saco PE interno ou saco PP tecido sem forro. Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: Papel, PP, saco de PE, saco de PP – 2,5Kg 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 4,5Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg				
15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE ou AI/PE ou papel/AI/PE em embalagens de PE/PP (cubas, baldes ou bolsas). Embalagem primária: saquetas de papel/PE, AI/PE ou papel/AI/PE. Embalagem secundária: embalagens de PE/PP (cubas, baldes ou bolsas) 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg,16 Kg,17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.				
15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE, AI/PE ou papel/AI/PE, ambas em cartolina/PE. Embalagem primária: saquetas de papel/PE, AI/PE ou papel/AI/PE. Embalagem secundária: embalagens de ambas em cartolina/PE 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg,16 Kg,17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.				
15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE, AI/PE ou papel/AI/PE, ambas em cartolina/cartão canelado. Embalagem primária: saquetas de papel/PE, AI/PE ou papel/AI/PE. Embalagem secundária: cartolina/cartão canelado 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg,16 Kg,17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.				
Isco a granel em embalagens PE/PP (cubas, baldes ou bolsas). Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: embalagens PE/PP (cubas, baldes ou bolsas) 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg,16 Kg,17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.				
Isco a granel em embalagens de cartão laminado com PE. Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: cartão laminado com PE, 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg,16 Kg,17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg. Embalagem restrita a sacos embalados separadamente com um tamanho máximo de 10Kg.				
Isco a granel até 20g (ratos e ratazanas) e até 60g (somente ratazanas) embaladas em bandejas de isco com tampa selada a quente embalada em múltiplos de embalagens em cartolina. Embalagem primária: bandejas de isco com				

tampa selada a quente. Embalagem secundária: cartão canelado com múltiplas embalagens primárias:

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96,
120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

Isco a granel até 20g (ratos e ratazanas) e até 60g (somente ratazanas) embaladas em bandejas de isco com tampa selada a quente embalada em estações de isco de invioláveis PEAD ou PP, de uso único ou multiuso, todas embaladas em múltiplos 1, 2 ou 4 em cartão canelado blister ou manga de cartão canelado ou saco PE termo-selado a quente com *topper* de cartão canelado. Embalagem primária: bandejas de isco com uma tampa selada a quente. Embalagem secundária: Estação de isco em PEAD ou PP, embalada em cartão canelado exterior ou blister ou cartão micro-canelado, ou saco PE termo-selado a quente com *topper* de cartão canelado. Múltiplos:

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72,
96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24,
32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

240g - 16, 24, 32, 48, 60

4.4.1. Instruções específicas de utilização

Para rato-doméstico aplicar 5-20g de isco em estações de isco invioláveis.

Aplicar 5-20g de isco em estações de isco invioláveis, espaçadas de 5m (para infestações severas separadas cada 2m) nas áreas de actividade dos roedores.

O

rato-doméstico é muito curioso e pode ajudar o programa de controlo, mover os iscos a cada 2-3 dias no momento em que os pontos de isco são inspecionados ou reabastecidos. Fazer inspecções frequentes às estações de isco durante os primeiros 10-14 dias e substituir o isco comido pelos roedores, danificados por água ou contaminados por sujidade. Se em algumas zonas o isco foi comido, aumentar a quantidade de isco, colocando mais estações de isco. Não aumentar o tamanho do ponto de isco. Substituir o isco comido pelos roedores, danificados por água ou contaminados por sujidade.

As estações de isco devem ser visitadas a cada 2 a 3 dias após o início do tratamento e posteriormente pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactos e para remover os corpos de roedores. Reabastecer as estações de isco se necessário.

Siga todas as instruções adicionais fornecidas pelo código relevante de boas práticas.

Realizar um levantamento prévio da área infestada e uma avaliação no local, a fim de identificar as espécies de roedores, seus locais de actividade e determinar a provável causa e a extensão da infestação.

O produto só deve ser usado como parte de um sistema de gestão Integrada de pragas (IPM), incluindo, entre outras, medidas de higiene e, quando possível, métodos físicos de controlo.

O estado de resistência da população-alvo deve ser levado em consideração na escolha do rodenticida a ser usado. Nas áreas em que há suspeita de resistência a substâncias activas específicas, evitar seu uso.

Para controlar a propagação de resistências, é aconselhável alternar iscos contendo diferentes substâncias activas anticoagulantes [Se a política local ou legislação nacional exigir].

Quando o produto estiver a ser aplicado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve ser feito um aviso explicando o risco de envenenamento primário ou secundário pelo anticoagulante, bem como indicar as primeiras medidas a serem tomadas em caso de envenenamento, devendo ser disponibilizado ao lado dos iscos.

A utilização deste produto deve eliminar roedores no prazo de 35 dias. A informação do produto (i.e. rótulo e/ou folheto) deve claramente recomendar que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (i.e. a actividade dos roedores ainda é observada), o usuário deve procurar aconselhamento do fornecedor do produto ou chamar um serviço profissional de controlo de pragas.

4.4.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Usar luvas protectoras resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (EN374).

Não usar iscos contendo substâncias activas anticoagulantes como iscos permanentes para a prevenção de infestação de roedores ou monitorização de actividades dos roedores.

4.4.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o

Ao colocar estações de isco perto de sistemas de drenagem de água, certifique-se em evitar o contacto do isco com a água.

4.4.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuma

4.4.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuma

4.5. Ratazanas - Profissionais - Interior

Tipo(s) do produto	TP 14 - Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas.
Campos de utilização	Interior
	Interior
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Organismos alvo	

Nome científico	Nome comum	Estadio de desenvolvimento
Rattus norvegicus	Ratazana Cinzenta	Adultos e Juvenis

Método(s) de aplicação

Método isco	Aplicação de
Descrição	Isco pronto a usar em estações de isco invioláveis.
Taxa: em áreas de elevadas infestação)	10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas 10m (5m
Diluição:	0%
Duração:	Ratazanas: 10 a 60 g de isco por estação de isco. Infestação elevada - 10 a 60g de isco em estações de isco, a cada 5 metros Infestação baixa - 10 a 60g de isco em estações de isco, a cada 10 metros

Capacidade e material da embalagem

Tamanho mínimo de embalagem de 2,5kg.

25Kg em papel multi-folhas laminando com PE (barreira de humidade) ou papel multi-folhas com saco PE interno ou PP tecido com saco PE interno ou saco PP tecido sem forro. Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: Papel, PP, saco de PE, saco de PP – 2,5Kg 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 4,5Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg.

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE ou Al/PE ou papel/Al/PE em embalagens de PE/PP (cubas, baldes ou bolsas). Embalagem primária: saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: embalagens de PE/PP (cubas, baldes ou bolsas) 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE, ambas em cartolina/PE. Embalagem primária: saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: embalagens de ambas em cartolina/PE 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE, ambas em cartolina/cartão canelado. Embalagem primária: saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: cartolina/cartão canelado 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

Isco a granel em embalagens PE/PP (cubas, baldes ou bolsas). Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: embalagens PE/PP (cubas, baldes ou bolsas) 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

Isco a granel em embalagens de cartão laminado com PE. Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: cartão laminado com PE, 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

Embalagem restrita a sacos embalados separadamente com um tamanho máximo de 10Kg.

Isco a granel até 20g (ratos e ratazanas) e até 60g (somente ratazanas) embaladas em bandejas de isco com tampa selada a quente embalada em múltiplos de embalagens em cartolina. Embalagem primária: bandejas de isco com tampa selada a quente. Embalagem secundária: cartão canelado com múltiplas embalagens primárias:

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72,
96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

Isco a granel até 20g (ratos e ratazanas) e até 60g (somente ratazanas) embaladas em bandejas de isco com tampa selada a quente embalada em estações de isco de invioláveis PEAD ou PP, de uso único ou multiuso, todas embaladas em múltiplos 1, 2 ou 4 em cartão canelado blister ou manga de cartão canelado ou saco PE termo-selado a quente com *topper* de cartão canelado. Embalagem primária: bandejas de isco com uma tampa selada a quente. Embalagem secundária: Estação de isco em PEAD ou PP, embalada em cartão canelado exterior ou blister ou cartão micro-canelado, ou saco PE termo-selado a quente com *topper* de cartão canelado. Múltiplos:

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96,
120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32,
48, 60, 72, 96

120g - 24, 32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

240g - 16, 24, 32, 48, 60

4.5.1. Instruções específicas de utilização

Para ratazanas, usar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas de 10m.

Aplicar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas de 10m (separadas por 5m em áreas de elevada infestação) em áreas de actividade dos roedores.

Verificar regularmente o consumo do isco e substituir o isco consumido ou estragado até que o consumo tenha parado. Repetir o tratamento em situações em que haja evidência de nova infestação (por exemplo, novas trilhos ou excrementos). Não mova ou perturbe os pontos de isco por vários dias após a colocação do isco.

Caso não haja nenhum sinal de actividade das ratazanas próximo do isco após 7-10 dias, mover o isco para uma área de maior actividade dos roedores. Se todo o isco foi comido em certas áreas, aumente a quantidade de isco colocando mais pontos de isco. Não aumente o tamanho do ponto de isco. Substitua o isco comido por roedores, danificado por água ou contaminado por sujidade.

As estações de isco devem ser verificadas apenas 5 a 7 dias após o início do tratamento e posteriormente pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e remover os corpos de roedores. Reabastecer o isco quando necessário.

Siga todas as instruções adicionais fornecidas pelo código relevante de boas práticas.

Realizar um levantamento prévio da área infestada e uma avaliação no local, a fim de identificar as espécies de roedores, seus locais de actividade e determinar a provável causa e a extensão da infestação.

O produto só deve ser usado como parte de um sistema de gestão Integrada de pragas (IPM), incluindo, entre outras, medidas de higiene e, quando possível, métodos físicos de controlo.

O estado de resistência da população-alvo deve ser levado em consideração na escolha do rodenticida a ser usado. Nas áreas em que há suspeita de resistência a substâncias activas específicas, evitar seu uso.

Para controlar a propagação de resistências, é aconselhável alternar iscos contendo diferentes substâncias activas anticoagulantes [Se a política local ou legislação nacional exigir].

Quando o produto estiver a ser aplicado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve ser feito um aviso explicando o risco de envenenamento primário ou secundário pelo anticoagulante, bem como indicar as primeiras medidas a serem tomadas em caso de envenenamento, devendo ser disponibilizado ao lado dos iscos.

4.5.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Usar luvas protectoras resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (EN374).

Não usar iscos contendo substâncias activas anticoagulantes como iscos permanentes para a prevenção de infestação de roedores ou monitorização de actividades dos roedores.

4.5.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o

Ao colocar estações de isco perto de sistemas de drenagem de água, certifique-se em evitar o contacto do isco com a água.

4.5.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuma

4.5.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhum

4.6. Rato-doméstico e/ou ratazanas - Profissionais - Exterior, ao redor de edifícios

Tipo(s) do produto TP 14 - Rodenticidas

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada Não relevante para rodenticidas.

Campos de utilização Exterior
edifícios Exterior, ao redor de

Categoria(s) de utilizadores Profissional

Organismos alvo	Nome científico	Nome comum	Estadio de desenvolvimento
	Mus musculus e/ou Rattus norvegicus	Rato-doméstico e/ou Ratazana Cinzenta	Adultos e Juvenis

Método(s) de aplicação

Método Aplicação de isco

Descrição

Isco pronto a usar em estações de isco invioláveis.

Taxa: Para rato-doméstico, usar até 20g em estações de isco invioláveis. Para ratazana, usar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis, espaçadas 10m.

Diluição: 0%

Duração:

Rato-doméstico: 5 a 20 g de isco por estação de isco.

Infestação elevada - 5 a 20g isco em estações de isco, a cada 2 metros.

Infestação baixa - 5 a 20g isco em estações de isco, a cada 5 metros.

Ratazanas: 10 a 60 g de isco por estação de isco.

Infestação elevada - 10 a 60g isco em estações de isco, a cada 5 metros.

Infestação baixa - 10 a 60g isco em estações de isco, a cada 10 metros.

Capacidade e material da embalagem

Tamanho mínimo de embalagem de 2,5Kg.

25Kg em papel multi-folhas laminando com PE (barreira de humidade) ou papel multi-folhas com saco PE interno ou PP tecido com saco PE interno ou saco PP tecido sem forro. Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: Papel, PP, saco de PE, saco de PP – 2,5Kg 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 4,5Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg.

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE ou AI/PE ou papel/AI/PE em embalagens de PE/PP (cubas, baldes ou bolsas). Embalagem primária: saquetas de papel/PE, AI/PE ou papel/AI/PE. Embalagem secundária: embalagens de PE/PP (cubas, baldes ou bolsas) 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE, AI/PE ou papel/AI/PE, ambas em cartolina/PE. Embalagem primária: saquetas de papel/PE, AI/PE ou papel/AI/PE. Embalagem secundária: embalagens de ambas em cartolina/PE 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE, AI/PE ou papel/AI/PE, ambas em cartolina/cartão canelado. Embalagem primária: saquetas de papel/PE, AI/PE ou papel/AI/PE. Embalagem secundária: cartolina/cartão canelado 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

Isco a granel em embalagens PE/PP (cubas, baldes ou bolsas). Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: embalagens PE/PP (cubas, baldes ou bolsas) 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

Isco a granel em embalagens de cartão laminado com PE. Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: cartão laminado com PE, 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

Embalagem restrita a sacos embalados separadamente com um tamanho máximo de 10Kg.

Isco a granel até 20g (ratos e ratazanas) e até 60g (somente ratazanas) embaladas em bandejas de isco com tampa selada a quente embalada em

múltiplos de embalagens em cartolina. Embalagem primária: bandejas de isco com tampa selada a quente. Embalagem secundária: cartão canelado com múltiplas embalagens primárias:

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96,
120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

Isco a granel até 20g (ratos e ratazanas) e até 60g (somente ratazanas) embaladas em bandejas de isco com tampa selada a quente embalada em estações de isco de invioláveis PEAD ou PP, de uso único ou multiuso, todas embaladas em múltiplos 1, 2 ou 4 em cartão canelado blister ou manga de cartão canelado ou saco PE termo-selado a quente com *topper* de cartão canelado. Embalagem primária: bandejas de isco com uma tampa selada a quente. Embalagem secundária: Estação de isco em PEAD ou PP, embalada em cartão canelado exterior ou blister ou cartão micro-canelado, ou saco PE termo-selado a quente com *topper* de cartão canelado. Múltiplos:

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72,
96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24,
32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

240g - 16, 24, 32, 48, 60

4.6.1. Instruções específicas de utilização

Para rato-doméstico aplicar 5-20g de isco em estações de isco invioláveis.

Aplicar 5-20g de isco em estações de isco invioláveis, espaçadas de 5m (para infestações severas separadas cada 2m) nas áreas de actividade dos roedores. O rato-doméstico é muito curioso e pode ajudar o programa de controlo, mover os iscos a cada 2-3 dias no momento em que os pontos de isco são inspeccionados ou reabastecidos. Fazer inspecções frequentes às estações de isco durante os primeiros 10-14 dias e substituir o isco comido pelos roedores, danificados por água ou contaminados por sujidade. Se em algumas zonas o isco foi comido, aumentar a quantidade de isco, colocando mais estações de isco. Não aumentar o tamanho do ponto de isco. Substituir o isco comido pelos roedores, danificados por água ou contaminados por sujidade.

Para ratazanas, usar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas 10m.

Aplicar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas de 10m (separadas por 5m em áreas de elevada infestação) em áreas de actividade dos roedores. Verificar regularmente o consumo do isco e substituir o isco consumido ou estragado até que o consumo tenha parado. Repetir o tratamento em situações em que haja evidência de nova infestação (por exemplo, novas trilhos ou excrementos). Não mova ou perturbe os pontos de isco por vários dias após a colocação do isco. Caso não haja nenhum sinal de actividade das ratazanas próximo do isco após 7-10 dias, mover o isco para uma área de maior actividade dos roedores. Se todo o isco foi comido em certas áreas, aumente a quantidade de isco colocando mais pontos de isco. Não aumente o tamanho do ponto de isco. Substitua o isco comido por roedores, danificado por água ou contaminado por sujidade.

Proteger o isco das condições atmosféricas (ex: chuva, neve, etc.). Coloque as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.

Substitua o isco comido por roedores, danificado por água ou contaminado por sujidade.

Siga todas as instruções adicionais fornecidas pelo código relevante de boas práticas.

Realizar um levantamento prévio da área infestada e uma avaliação no local, a fim de identificar as espécies de roedores, seus locais de actividade e determinar a provável causa e a extensão da infestação.

O produto só deve ser usado como parte de um sistema de gestão Integrada de pragas (IPM), incluindo, entre outras, medidas de higiene e, quando possível, métodos físicos de controlo.

O estado de resistência da população-alvo deve ser levado em consideração na escolha do rodenticida a ser usado. Nas áreas em que há suspeita de resistência a substâncias activas específicas, evitar seu uso. Para controlar a propagação de resistências, é aconselhável alternar iscos contendo diferentes substâncias activas anticoagulantes

[Se a política local ou legislação nacional exigir]. Quando o produto estiver a ser aplicado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve ser feito um aviso explicando o risco de envenenamento primário ou secundário pelo anticoagulante, bem como indicar as primeiras medidas a serem tomadas em caso de envenenamento, devendo ser disponibilizado ao lado dos iscos.

A utilização deste produto deve eliminar roedores no prazo de 35 dias. A informação do produto (i.e. rótulo e/ou folheto) deve claramente recomendar que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (i.e. a actividade dos roedores ainda é observada), o usuário deve procurar aconselhamento do fornecedor do produto ou chamar um serviço profissional de controlo de pragas.

4.6.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Usar luvas protectoras resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (EN374).

Não aplicar o produto directamente nas tocas.

4.6.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o

Ao colocar estações de isco perto de sistemas de drenagem de água, certifique-se em evitar o contacto do isco com a água.

4.6.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuma

4.6.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuma

4.7. Rato-doméstico e/ou ratazanas - Profissionais treinados - Interior

Tipo(s) do produto	TP 14 - Rodenticidas		
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas.		
Campos de utilização	Interior		
	Interior		
Categoria(s) de utilizadores	Profissional treinado		
Organismos alvo	Nome científico	Nome comum	Estadio de desenvolvimento
	Mus musculus e/ou Rattus norvegicus	Rato-doméstico e/ou Ratazana Cinzenta	Adultos e Juvenis
Método(s) de aplicação			
Método	Aplicação de isco		
Descrição	Isco pronto a usar, para uso em pontos de isco cobertos ou em estações de isco invioláveis		
Taxa:	Para rato-doméstico, até 20g em estações de isco invioláveis ou pontos de isco cobertos. Para ratazanas, usar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis ou pontos de isco cobertos, espaçadas 10m.		
Diluição:	0%		
Duração:	Rato-doméstico - 5 a 20 g de isco por estação de isco. Infestação elevada - 5 a 20g isco em estações de isco, a cada 2 metros Infestação baixa - 5 a 20g isco em estações de isco, a cada 5 metros Ratazanas -10 a 60 g de isco por estação de isco. Infestação elevada - 10 a 60g isco em estações de isco, a cada 5 metros Infestação baixa - 10 a 60g isco em estações de isco, a cada 10 metros		
Capacidade e material da embalagem			
Tamanho mínimo de embalagem de	2,5Kg		
	25Kg em papel multi-folhas laminando com PE (barreira de humidade) ou papel multi-folhas com saco PE interno ou PP tecido com saco PE interno ou saco PP tecido sem forro. Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: Papel, PP, saco de PE, saco de PP – 2,5Kg 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 4,5Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg		
	15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE ou Al/PE ou papel/Al/PE em embalagens de PE/PP (cubas, baldes ou bolsas). Embalagem primária: saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: embalagens de PE/PP (cubas, baldes ou bolsas) 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg		
	15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE, ambas em cartolina/PE. Embalagem primária: saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: embalagens de ambas em cartolina/PE 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg		

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE, ambas em cartolina/cartão canelado. Embalagem primária: saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: cartolina/cartão canelado 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

Isco a granel em embalagens PE/PP (cubas, baldes ou bolsas). Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: embalagens PE/PP (cubas, baldes ou bolsas) 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg

Isco a granel em embalagens de cartão laminado com PE. Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: cartão laminado com PE, 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

Embalagem restrita a sacos embalados separadamente com um tamanho máximo de 10Kg.

Isco a granel até 20g (ratos e ratazanas) e até 60g (somente ratazanas) embaladas em bandejas de isco com tampa selada a quente embalada em múltiplos de embalagens em cartolina. Embalagem primária: bandejas de isco com tampa selada a quente. Embalagem secundária: cartão canelado com múltiplas embalagens primárias:

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

Isco a granel até 20g (ratos e ratazanas) e até 60g (somente ratazanas) embaladas em bandejas de isco com tampa selada a quente embalada em estações de isco de invioláveis PEAD ou PP, de uso único ou multiuso, todas embaladas em múltiplos 1, 2 ou 4 em cartão canelado blister ou manga de cartão canelado ou saco PE termo-selado a quente com *topper* de cartão canelado. Embalagem primária: bandejas de isco com uma tampa selada a quente. Embalagem secundária: Estação de isco em PEAD ou PP, embalada em cartão canelado exterior ou blister ou cartão micro-canelado, ou saco PE termo-selado a quente com *topper* de cartão canelado. Múltiplos

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72,
96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24,
32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

240g - 16, 24, 32, 48, 60

4.7.1. Instruções específicas de utilização

-

Remova o produto restante no final do período de tratamento.

- Quando disponível, siga todas as instruções adicionais fornecidas pelo código relevante de boas práticas.

Realizar um levantamento prévio da área infestada e uma avaliação no local, a fim de identificar as espécies de roedores, seus locais de actividade e determinar a provável causa e a extensão da infestação.

O produto só deve ser usado como parte de um sistema de gestão Integrada de pragas (IPM), incluindo, entre outras, medidas de higiene e, quando possível, métodos físicos de controlo.

[Se a política ou legislação nacional exigir] Quando o produto estiver a ser aplicado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve ser feito um aviso explicando o risco de envenenamento primário ou secundário pelo anticoagulante, bem como indicar as primeiras medidas a serem tomadas em caso de envenenamento, devendo ser disponibilizado ao lado dos iscos.

Não usar este produto em tratamentos de iscagem permanente.

Se usado para tratamentos de iscagem faseada:

- Substitua o isco consumido somente após 3 dias e depois em intervalos máximos de 7 dias. Recolher qualquer isco derramado e os roedores mortos.

- Quando disponível, siga todas as instruções adicionais fornecidas pelo código relevante de boas práticas a nível nacional.

4.7.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Sempre que possível, antes do tratamento, informe qualquer possível pessoa presente (ex.: usuários da área tratada e circundante) sobre a desinfestação em curso para o controlo de roedores.

Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover roedores mortos durante o tratamento em intervalos frequentes, de acordo com as recomendações fornecidas pelo código relevante de boas práticas.

Não usar este produto como isco permanente para prevenção de infestação de roedores ou monitorização da actividade de roedores.

Usar luvas protectoras resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (EN374).

4.7.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o

Ao colocar estações de isco perto de sistemas de drenagem de água, certifique-se em evitar o contacto do isco com a água.

4.7.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuma

4.7.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuma

4.8. Rato-doméstico e/ou ratas - Profissionais treinados - Exterior, ao redor de edifícios

Tipo(s) do produto	TP 14 - Rodenticidas		
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas.		
Campos de utilização	Exterior		
de edifícios	Exterior, ao redor		
Categoria(s) de utilizadores	Profissional treinado		
Organismos alvo	Nome científico Mus Musculus e/ou Rattus norvegicus	Nome comum Rato-doméstico e/ou Ratazana Cinzenta	Estadio de desenvolvimento Adultos e Juvenis
Método(s) de aplicação			
Método	Aplicação de isco		
Descrição	Isco pronto a usar, para uso em pontos de isco cobertos ou em estações de isco invioláveis		
Taxa:	Para rato-doméstico, até 20g em estações de isco invioláveis ou pontos de isco cobertos. Para ratazana, usar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis ou pontos de isco cobertos, espaçadas 10m.		
Diluição:	0%		
Duração:			
	Rato-doméstico - 5 a 20 g de isco por estação de isco.		
	Infestação elevada - 5 a 20g isco em estações de isco, a cada 2 metros		
	Infestação baixa - 5 a 20g isco em estações de isco, a cada 5 metros		
	Ratazanas - 10 a 60 g de isco por estação de isco.		
	Infestação elevada - 10 a 60g isco em estações de isco, a cada 5 metros		
	Infestação baixa - 10 a 60g isco em estações de isco, a cada 10 metros		
	Aplicação de isco em tocas - 10 a 60 g de isco por toca		
Capacidade e material da embalagem			
	Tamanho mínimo de embalagem de 2,5Kg		
	25Kg em papel multi-folhas laminando com PE (barreira de humidade) ou papel multi-folhas com saco PE interno ou PP tecido com saco PE interno ou saco PP tecido sem forro. Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: Papel, PP, saco de PE, saco de PP – 2,5Kg 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 4,5Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg		
	15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE ou Al/PE ou papel/Al/PE em embalagens de PE/PP (cubas, baldes ou bolsas). Embalagem primária: saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: embalagens de PE/PP (cubas, baldes ou bolsas) 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg,16 Kg,17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg		
	15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE, ambas em cartolina/PE. Embalagem primária: saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: embalagens de ambas em cartolina/PE 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg,16 Kg,17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg		

15, 20, 25, 30, 50 ou 60g saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE, ambas em cartolina/cartão canelado. Embalagem primária: saquetas de papel/PE, Al/PE ou papel/Al/PE. Embalagem secundária: cartolina/cartão canelado 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

Isco a granel em embalagens PE/PP (cubas, baldes ou bolsas). Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: embalagens PE/PP (cubas, baldes ou bolsas) 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg

Isco a granel em embalagens de cartão laminado com PE. Embalagem primária: N/A. Embalagem secundária: cartão laminado com PE, 2,5Kg, 3Kg, 3,5Kg, 4Kg, 5Kg, 6Kg, 7Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 11Kg, 12Kg, 13Kg, 14Kg, 15Kg, 16 Kg, 17Kg, 18Kg, 19Kg, 20Kg.

Embalagem restrita a sacos embalados separadamente com um tamanho máximo de 10Kg.

Isco a granel até 20g (ratos e ratas) e até 60g (somente ratas) embaladas em bandejas de isco com tampa selada a quente embalada em múltiplos de embalagens em cartolina. Embalagem primária: bandejas de isco com tampa selada a quente. Embalagem secundária: cartão canelado com múltiplas embalagens primárias:

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

Isco a granel até 20g (ratos e ratas) e até 60g (somente ratas) embaladas em bandejas de isco com tampa selada a quente embalada em múltiplos de embalagens em cartolina. Embalagem primária: bandejas de isco com tampa selada a quente. Embalagem secundária: Estação de isco em PEAD ou PP, embalada em cartão canelado exterior ou blister ou cartão micro-canelado, ou saco PE termo-selado a quente com *topper* de cartão canelado. Múltiplos

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24, 32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

240g - 16, 24, 32, 48, 60

4.8.1. Instruções específicas de utilização

Proteger o isco das condições atmosféricas.
Coloque as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.

Substitua o isco comido por roedores, danificado por água ou contaminado por sujidade.

Remova o produto restante no final do período de tratamento. [Não aplicável quando explicitamente autorizado de acordo com o anexo 4]

Quando disponível, siga todas as instruções adicionais fornecidas pelo código relevante de boas práticas.

Se usado para tratamentos de iscagem faseada: - Substitua o isco consumido somente após 3 dias e depois em intervalos máximos de 7 dias. Recolher qualquer isco derramado e os roedores mortos. - Quando disponível, siga todas as instruções adicionais fornecidas pelo código relevante de boas práticas.

[Para uso externo, os pontos de isco devem ser cobertos e protegidos e colocados em locais estratégicos para minimizar a sua exposição a espécies não visadas]. Quando disponível, siga todas as instruções adicionais fornecidas pelo código relevante de boas práticas.

Quando aplicado em tocas: os iscos devem ser colocados de forma a minimizar a exposição a espécies não visadas e crianças. Cubra ou bloqueie as entradas das tocas com iscos, para reduzir os riscos do isco ser rejeitado e derramado.

Realizar um levantamento prévio da área infestada e uma avaliação no local, a fim de identificar as espécies de roedores, seus locais de actividade e determinar a provável causa e a extensão da infestação.

O produto só deve ser usado como parte de um sistema de gestão Integrada de pragas (IPM), incluindo, entre outras, medidas de higiene e, quando possível, métodos físicos de controlo.

[Se a política ou legislação nacional exigir] Quando o produto estiver a ser aplicado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve ser feito um aviso explicando o risco de envenenamento primário ou secundário pelo anticoagulante, bem como indicar as primeiras medidas a serem tomadas em caso de envenenamento, devendo ser disponibilizado ao lado dos iscos.

4.8.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Sempre que possível, antes do tratamento, informe qualquer possível pessoa presente (ex.: usuários da área tratada e circundante) sobre a desinfestação em curso para o controlo de roedores.

Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover roedores mortos durante o tratamento em intervalos frequentes, de acordo com as recomendações fornecidas pelo código relevante de boas práticas.

Não usar este produto como isco permanente para prevenção de infestação de roedores ou monitorização da actividade de roedores.

Quando aplicado em tocas: os iscos devem ser colocados para minimizar a exposição a espécies não visadas e crianças.

Cubra ou bloqueie as entradas das tocas com iscos, para reduzir os riscos do isco ser rejeitado e derramado.

Usar luvas protectoras resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (EN374).

4.8.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o

Ao colocar pontos de isco perto de sistemas de águas superficiais (por exemplo, rios, lagoas, canais de água, diques, valas de irrigação), certifique-se em evitar o contacto do isco com a água.

4.8.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuma

4.8.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhum

5. Orientações gerais para a utilização

5.1. Instruções de utilização

Ler o rótulo antes da utilização e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que sejam fornecidas no ponto de venda.

Considerar medidas de controlo preventivo (ex.: tapar buracos, remover ao máximo possíveis fontes de alimentação e água) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de reinfestação.

Antes do uso de produtos rodenticidas, devem ser considerados métodos de controlo não químicos (ex.: armadilhas).

Remover todas as outras fontes de alimentação que estejam ao alcance dos roedores (ex.: grãos ou resíduos alimentares), mas não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que isso perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.

Não abrir as saquetas que contêm o isco.
(Profissionais treinados - somente para saquetas não descartáveis).

As estações de isco devem ser colocadas na proximidade dos locais onde foi observada actividade de roedores. Sempre que possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.

Não colocar as estações de isco na proximidade de sistemas de drenagem de águas onde possam entrar em contacto com água.

Colocar as estações de isco longe de alimentos, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos

Coloque as estações de isco fora do alcance de crianças, aves, animais de estimação, animais de criação e outros animais não visados.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização do produto. Lavar as mãos e a pele directamente exposta após manuseamento.

Profissionais e Profissionais treinados: se após um período de tratamento de 35 dias os iscos continuarem a ser consumidos e não for observado nenhum declínio na actividade dos roedores, deve ser determinada a causa provável.

Onde outros elementos foram excluídos, é provável que existam roedores resistentes, pelo que considere o uso de um rodenticida não anticoagulante, quando disponível, ou um rodenticida anticoagulante mais potente. Considere também o uso de armadilhas como medida alternativa de controlo.

Profissionais e Profissionais treinados: pellets a granel - coloque o isco na estação de isco usando um dispositivo doseador. Especifique os métodos para minimizar o pó (ex.: limpeza com toalhetes húmidos).

5.2. Medidas de redução do risco

Eliminar os roedores mortos em conformidade com as exigências locais. O método de eliminação deve ser descrito especificamente no SPC nacional e estar reflectido no rótulo do produto].

Procure e remova os roedores mortos durante o tratamento, pelo menos tantas vezes quanto as estações de isco são inspeccionadas.

A utilização deste produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias.

A informação do produto (i.e. rótulo e/ou folheto) deve claramente recomendar que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (i.e. a actividade dos roedores ainda é observada), o usuário deve procurar aconselhamento do fornecedor do produto ou chamar um serviço profissional de controlo de pragas.

[Para produtos a serem autorizados para utilizadores Profissionais:] A informação do produto (i.e. rótulo e/ou folheto) deve mostrar claramente que o produto não deve ser fornecido ao público em geral (ex.: "Apenas para Profissionais").

[Para produtos a serem autorizados para Profissionais treinados:] A informação do produto (i.e. rótulo e/ou folheto) deve mostrar claramente que o produto deve ser fornecido somente a Profissionais treinados que possuam certificação demonstrando conformidade com os requisitos de formação aplicáveis (ex.: "apenas para Profissionais treinados")

Profissionais: Não lavar com água as estações de isco entre aplicações.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência |

Este produto contém uma substância anticoagulante. Em caso de ingestão, os sintomas (que podem demorar a manifestar-se) podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas. Em casos graves, podem surgir hematomas e a presença de sangue nas fezes ou na urina.

Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário.

Em caso de contacto com a pele, lavar com água e depois com sabonete e água.

Em caso de contacto com os olhos, enxaguar os olhos com água ou líquido para enxaguar os olhos e mantenha as pálpebras abertas pelo menos 10 minutos.

Em caso de ingestão, enxaguar a boca com água. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente Não provocar o vômito. Contacte o Centro de Informação Antivenenos ou um médico e mostre a embalagem ou o rótulo.

Contactar um médico veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia.

As estações de isco devem ser rotuladas com as seguintes informações: "não mover ou abrir"; "contém um rodenticida"; "nome do produto ou número de autorização"; "substância(s) ativa(s)" e "em caso de incidente, ligue para o Centro de Informação Antivenenos (808 250 143).

Perigoso para a vida selvagem.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

No final do tratamento, descarte o isco não consumido e a embalagem de acordo com os requisitos locais.

Recomenda-se o uso de luvas.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Prazo de validade: 24 meses

Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado e ao abrigo da luz solar.

Armazenar em local inacessível a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação.

Mantenha apenas na embalagem original.

6. Outras informações

Devido ao seu modo de acção retardado, os rodenticidas anticoagulantes podem levar de 4 a 10 dias para serem eficazes após o consumo efetivo do isco.

Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar nos roedores mortos com as mãos nuas. Utilizar luvas ou ferramentas (ex.: pinças) ao removê-los.

Este produto contém um agente amargante e um corante.